


Qué necesita saber sobre EL HERPES ZÓSTER

La culebrilla, o herpes zóster, es una infección que causa una erupción dolorosa y que puede generar complicaciones graves como la pérdida de visión si no se trata a tiempo.

¿Ha pasado la varicela?

Infórmese sobre el herpes zóster y cómo puede afectarle:



● Datos sobre el herpes zóster

- El herpes zóster solo se da en personas que ya han pasado la varicela. En ambos casos la causa es el mismo virus, el de la varicela-zóster (VVZ).
- Aproximadamente una de cada tres personas en Estados Unidos contraerá el herpes zóster.
- Tener más de 40 años, tener un

sistema inmunitario debilitado y tomar ciertos medicamentos son factores que incrementan el riesgo de padecer herpes zóster.

- El herpes zóster puede causar un dolor de origen nervioso y prolongado llamado neuralgia posherpética (PHN, por sus siglas).

● Síntomas del herpes zóster

El hormigueo y picor en un lado de la cara o del cuerpo pueden ser un primer síntoma. En el caso del herpes zóster, este evoluciona a una erupción dolorosa con ampollas que puede durar de dos a cuatro semanas.

Otros posibles síntomas son:




Fiebre y escalofríos



Malestar estomacal



Dolor de cabeza



Preguntas para hacerle a su médico:

- ¿Estoy en riesgo de padecer herpes zóster? ¿Por qué?
- ¿El herpes zóster puede transmitirse de una persona a otra? (¿Es contagioso?)
- ¿Existen formas de prevenir el herpes zóster?